

アミバンタマブ（商品名：ライブリバント点滴静注）

【起こる可能性のある副作用】

◎インフュージョンリアクション

- ・ 初めて治療するときや投与速度を速めたときに起こりやすいとされています。
- ・ 点滴中もしくは点滴終了後数時間以内に発熱、悪寒（寒気）、頭痛、息苦しさなどの症状が現れることがあります。
- ・ 症状に応じて点滴を中止もしくは点滴速度を遅くしたり、予防のお薬を使用することがあります。

◎皮膚障害①

- ・ にきびのような皮疹、皮膚の乾燥やひび割れ、爪周囲の炎症（爪囲炎）などの症状が現れることがあります。
- ・ 症状は全身に現れるため、入浴時など全身の観察を心がけましょう。
- ・ 症状の予防・悪化防止のため、保湿や保清を心がけましょう。
- ・ 症状に応じて塗り薬や飲み薬が処方されます。

◎下痢①

- ・ 飲水を心がけ、脱水に注意してください。
- ・ 症状に応じて、下痢止めなどが処方されます。

◎浮腫

- ・ 繰り返し治療することで起こりやすくなるとされています。
- ・ 症状がある部分は皮膚が弱くなっているためケガに注意し、乾燥や加圧は避けるようにしましょう。
- ・ 水分や塩分の摂り過ぎに注意し体重を測定し変動を確認するようにしましょう。

◎肺障害

- ・ 咳（特に痰が出ない咳）、息切れ、発熱が続くなど風邪に似た症状が現れることがあります。

◎血栓・塞栓

- ・ 血液中に血の塊ができたり、血の塊が血管を塞ぐことがあります。
- ・ 足にむくみがある、息苦しい、胸が痛い、意識がなくなる、麻痺が出る、言葉がうまく出ない、頭痛などの症状が現れることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。