

アザシチジン（商品名：ビダーザ注射用）

【起こる可能性のある副作用】

◎注射部位反応（皮下注射の場合）

- ・ 注射した部位に赤いはれ、痛み、かゆみなどの皮膚の反応を起こすことがあります。

◎発熱

- ・ 治療によって 38℃程度の熱が出る場合があります。

◎悪心・嘔吐

- ・ 治療前に吐き気を予防するお薬を使用します。
- ・ 予防薬の効果が十分得られない場合は、予防のお薬を追加する場合があります。

◎骨髄抑制

- ・ 白血球/好中球数減少（感染症にかかりやすい、発熱）、血小板減少（鼻血、あざができる、出血しやすい）、貧血（めまい、息切れ、疲れやすい）が起こることがあります。

◎便秘

- ・ 飲水を心がけてください。
- ・ 便の硬さ、便の出しにくさ、排便後の残便感などに応じて下剤などが処方されます。

◎肝機能障害

- ・ 肝臓に関連する血液検査の数値が異常値を示すことがあります。
- ・ 機能の低下により、白目や皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、痒くなる、疲れやすくなるなどの症状が現れることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。