

ベンダムスチン（商品名：トレアキシン点滴静注液）

【起こる可能性のある副作用】

◎発疹

- ・ 発疹が出る、皮膚が赤くなる、痒くなるなどの症状が現れることがあります。
- ・ 塗り薬や飲み薬を使用することがあります。

◎血管痛

- ・ お薬の刺激によって、点滴中や点滴後に血管に沿って痛みが出る場合があります。
- ・ 予防にホットパックを使用したり、輸液を追加することがあります。ホットパック使用中はやけどに注意しましょう。

◎血管外漏出

- ・ 静脈に投与した薬が血管外に漏れ出てしまう場合があります。
- ・ 大きな傷となってしまう可能性がありますので、注射部位の周りを観察し、痛みや腫れ、赤みや熱感を感じた場合は速やかに職員に声をかけてください。

◎悪心・嘔吐

- ・ 治療前に吐き気を予防するお薬を使用します。
- ・ 予防薬の効果が十分得られない場合は、予防のお薬を追加する場合があります。

◎骨髄抑制（目安の時期：1週間後以降）

- ・ 白血球/好中球数減少（感染症にかかりやすい、発熱）、血小板減少（鼻血、あざができる、出血しやすい）、貧血（めまい、息切れ、疲れやすい）が起こることがあります。

◎日和見感染

- ・ 免疫力が低下したために引き起こされる感染症により、咳、息切れ、息苦しさ、痰、発熱など風邪に似た症状などが現れることがあります。
- ・ 予防のお薬を併用することがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。