

ビンデシン（商品名：注射用フィルデシン）

【起こる可能性のある副作用】

◎血管痛

- ・ お薬の刺激によって、点滴中や点滴後に血管に沿って痛みが出ることがあります。
- ・ 予防にホットパックを使用したり、輸液を追加することがあります。ホットパック使用中はやけどに注意しましょう。

◎血管外漏出

- ・ 静脈に投与した薬が血管外に漏れ出てしまうことがあります。
- ・ 大きな傷となってしまう可能性がありますので、注射部位の周りを観察し、痛みや腫れ、赤みや熱感を感じた場合は速やかに職員に声をかけてください。

◎便秘

- ・ 飲水を心がけてください。
- ・ 便の硬さ、便の出しにくさ、排便後の残便感などに応じて下剤などが処方されます。

◎骨髄抑制

- ・ 白血球/好中球数減少（感染症にかかりやすい、発熱）、血小板減少（鼻血、あざができる、出血しやすい）、貧血（めまい、息切れ、疲れやすい）が起こることがあります。

◎末梢神経障害②

- ・ 手先・足先のしびれ感、痛み、感覚異常などの症状が現れることがあります。
- ・ 繰り返しの治療により症状が起こりやすくなる場合もあります。

◎脱毛

- ・ 治療開始 2～3 週間後から脱毛が始まる場合があります。
- ・ 多くの場合、治療終了後数か月経過すると再び毛が生え始めますが、毛質が変化することがあります。
- ・ 毛髪以外（眉毛、ひげ、体毛など）も脱毛は起こります。

◎腸閉塞

- ・ 便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐（おうと）、お腹が張る、腹痛などの症状が現れることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。