

ブレオマイシン（商品名：ブレオ注射用）

【起こる可能性のある副作用】

◎過敏反応

- ・ 息苦しさ、皮膚の発赤、かゆみ、全身が腫れるなどの症状が現れることがあります。
- ・ 初めて治療するときにかかることが多いですが、2回目以降に起こる場合もあります。

◎発熱

- ・ 治療によって 38℃程度の熱が出る場合があります。

◎肺障害

- ・ 咳（特に痰が出ない咳）、息切れ、発熱が続くなど風邪に似た症状が現れることがあります。

◎呼吸障害

- ・ 急な息切れや息苦しさ、呼吸がはやくなる、脈がはやくなるなどの症状が現れることがあります。

◎骨髄抑制（目安の時期：1週間後以降）

- ・ 白血球/好中球数減少（感染症にかかりやすい、発熱）、血小板減少（鼻血、あざができる、出血しやすい）、貧血（めまい、息切れ、疲れやすい）が起こることがあります。

◎脱毛

- ・ 治療開始 2～3 週間後から脱毛が始まる場合があります。
- ・ 多くの場合、治療終了後数か月経過すると再び毛が生え始めますが、毛質が変化することがあります。
- ・ 毛髪以外（眉毛、ひげ、体毛など）も脱毛は起こります。

◎色素沈着

- ・ 手や足、爪などが変色（褐色、黒色）することがあります。
- ・ 直射日光で色素沈着が悪化されるため、外出時に紫外線対策を行うことが大切です。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。