

チソツマブ ベドチン(商品名:テブダック点滴静注用)

【起こる可能性のある副作用】

◎皮膚障害③

- ・ 広い範囲の皮膚の赤みや高熱、唇や陰部のただれなどの症状が現れることがあります。

◎出血

- ・ 鼻出血、消化管出血(血便や黒色便)などの症状が現れることがあります。

◎脱毛

- ・ 治療開始 2～3 週間後から脱毛が始まる場合があります。
- ・ 多くの場合、治療終了後数か月経過すると再び毛が生え始めますが、毛質が変化することがあります。
- ・ 毛髪以外(眉毛、ひげ、体毛など)も脱毛は起こります。

◎視覚障害

- ・ 目が充血する、目が痛い、物がみえにくい、涙がでる、目が乾くなどの症状が起こることがあります。
- ・ 予防に点眼薬が処方されることがあります。

◎末梢神経障害②

- ・ 手先・足先のしびれ感、痛み、感覚異常などの症状が現れることがあります。
- ・ 繰り返しの治療により症状が起こりやすくなる場合もあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。