

デニロイキン ジフチクス(商品名:レミトロ点滴静注用)

【起こる可能性のある副作用】

◎インフュージョンリアクション

- ・ 初めて治療するときや投与速度を速めたときに起こりやすいとされています。
- ・ 点滴中もしくは点滴終了後数時間以内に発熱、悪寒(寒気)、頭痛、息苦しさなどの症状が現れることがあります。
- ・ 症状に応じて点滴を中止もしくは点滴速度を遅くしたり、予防のお薬を使用することがあります。

◎毛細血管漏出症候群

- ・ むくみや体重増加、息切れ、脈拍数増加、血圧低下などの症状が現れることがあります。

◎横紋筋融解症

- ・ 筋肉痛、手足の力が入らない、尿の色が赤褐色になるなどの症状が現れることがあります。

◎視覚障害

- ・ 目が充血する、目が痛い、物がみえにくい、涙がでる、目が乾くなどの症状が起こることがあります。
- ・ 予防に点眼薬が処方されることがあります。

◎色覚異常

- ・ 色がわかりにくくなる、視界に光が走るなどの症状が現れることがあります。

◎肝機能障害

- ・ 肝臓に関連する血液検査の数値が異常値を示すことがあります。
- ・ 機能低下により、白目や皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、痒くなる、疲れやすくなるなどの症状が現れることがあります。

◎骨髄抑制

- ・ 白血球/好中球数減少(感染症にかかりやすい、発熱)、血小板減少(鼻血、あざができる、出血しやすい)、貧血(めまい、息切れ、疲れやすい)が起こることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。