

ドキソルビン(リポソーム製剤) (商品名:ドキシル)

【起こる可能性のある副作用】

◎インフュージョンリアクション

- ・ 初めて治療するときや投与速度を速めたときに起こりやすいとされています。
- ・ 点滴中もしくは点滴終了後数時間以内に発熱、悪寒(寒気)、頭痛、息苦しさなどの症状が現れることがあります。
- ・ 症状に応じて点滴を中止もしくは点滴速度を遅くしたり、予防のお薬を使用することがあります。

◎着色尿

- ・ お薬の色により、治療後約1日は尿の色がピンク、オレンジ色に変化することがあります。

◎悪心・嘔吐

- ・ 治療前に吐き気を予防するお薬を使用します。
- ・ 予防薬の効果が十分得られない場合は、予防のお薬を追加する場合があります。

◎骨髄抑制 (目安の時期:1週間後以降)

- ・ 白血球/好中球数減少(感染症にかかりやすい、発熱)、血小板減少(鼻血、あざができる、出血しやすい)、貧血(めまい、息切れ、疲れやすい)が起こることがあります。

◎手足症候群 (目安の時期:1～2コース目)

- ・ 手足に、しびれやピリピリするような痛み、手足の赤みや腫れ、水ぶくれなどの症状が現れることがあります。
- ・ 皮膚への刺激や加圧は避け、保湿や保清を心がけましょう。
- ・ 症状に応じて塗り薬や飲み薬が処方されます。

◎口内炎 (目安の時期:1～2コース目)

- ・ 唇の裏、舌、上あご、頬の粘膜に起こりやすいとされています。
- ・ 柔らかい歯ブラシを使用し口の中を清潔に保つようにしましょう。適度なうがいによる口の中の保湿も効果的です。
- ・ 症状に応じて、うがい薬や塗り薬が処方されます。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。