

イホスファミド（商品名：注射用イホマイド）

【起こる可能性のある副作用】

◎悪心・嘔吐

- ・ 治療前に吐き気を予防するお薬を使用します。
- ・ 予防薬の効果が十分得られない場合は、予防のお薬を追加する場合があります。

◎出血性膀胱炎

- ・ 血尿、頻尿、排尿時痛、残尿感などの症状が現れることがあります。
- ・ 点滴当日と翌日は普段より多めの水分摂取を心掛け、我慢せずにお手洗いに行きましょう。
- ・ 予防に点滴を追加することがあります。

◎腎機能障害

- ・ 腎臓に関連する血液検査の数値が異常値を示すことがあります。
- ・ 尿量の低下、むくみ、血圧上昇などの症状が現れることがあります。
- ・ 点滴や飲水で予防することがあります。

◎骨髄抑制（目安の時期：1 週間以降）

- ・ 白血球/好中球数減少（感染症にかかりやすい、発熱）、血小板減少（鼻血、あざができる、出血しやすい）、貧血（めまい、息切れ、疲れやすい）が起こることがあります。

◎脱毛

- ・ 治療開始 2～3 週間後から脱毛が始まる場合があります。
- ・ 多くの場合、治療終了後数か月経過すると再び毛が生え始めますが、毛質が変化することがあります。
- ・ 毛髪以外（眉毛、ひげ、体毛など）も脱毛は起こります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。