

ネラビン(商品名:アラノジー静注用)

【起こる可能性のある副作用】

◎悪心・嘔吐

- ・ 治療前に吐き気を予防するお薬を使用します。
- ・ 予防薬の効果が十分得られない場合は、予防のお薬を追加する場合があります。

◎骨髄抑制

- ・ 白血球/好中球数減少(感染症にかかりやすい、発熱)、血小板減少(鼻血、あざができる、出血しやすい)、貧血(めまい、息切れ、疲れやすい)が起こることがあります。

◎横紋筋融解症

- ・ 筋肉痛、手足の力が入らない、尿の色が赤褐色になるなどの症状が現れることがあります。

◎末梢神経障害②

- ・ 手先・足先のしびれ感、痛み、感覚異常などの症状が現れることがあります。
- ・ 繰り返しの治療により症状が起こりやすくなる場合もあります。

◎中枢神経障害

- ・ 歩行時のふらつき、意識がもうろうとする、言葉が出にくいなどの症状が現れることがあります。

◎神経障害(ギランバレー様症状)

- ・ 運動神経や感覚神経の障害により起こります。
- ・ 手足がしびれたり、力が入らないなどの症状が現れることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。