

ニボルマブ(商品名:オプジーボ点滴静注)

【起こる可能性のある副作用】

◎肺障害

- ・ 咳(特に痰が出ない咳)、息切れ、発熱が続くなど風邪に似た症状が現れることがあります。

◎大腸炎

- ・ 排便回数の増加、便の性状変化(下痢、軟便、血便など)、腹痛、発熱などの症状が現れることがあります。
- ・ 持続する腹痛を伴うことがあります。

◎糖尿病

- ・ のどの渇き、多飲、多尿(夜間覚醒を伴う)、食欲不振、体重減少、悪心・嘔吐などの症状が現れることがあります。

◎皮膚障害②

- ・ 発疹、かゆみ、紅斑、白斑、皮膚乾燥、にきびのような皮疹、皮膚色素減少などの症状が現れることがあります。
- ・ 症状は治療終了後も継続することがあります。

◎筋炎関連

- ・ 疲れやすい、だるい、物が二重に見える、筋肉の痛み、体に力が入らない、息切れがする、胸が痛むなどの症状が現れることがあります。

◎甲状腺機能障害

- ・ 甲状腺機能の低下時は、声のかすれ、体重増加などの症状が現れることがあります。
- ・ 甲状腺機能の亢進時は、発汗過多、動悸などの症状が現れることがあります。その後、機能低下に至る場合もあります。
- ・ 甲状腺機能を表す値によって、お薬が処方されることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。