

ラムシルマブ（商品名：サイラムザ点滴静注液）

【起こる可能性のある副作用】

◎インフュージョンリアクション

- ・ 初めて治療するときや投与速度を速めたときに起こりやすいとされています。
- ・ 点滴中もしくは点滴終了後数時間以内に発熱、悪寒（寒気）、頭痛、息苦しさなどの症状が現れることがあります。
- ・ 症状に応じて点滴を中止もしくは点滴速度を遅くしたり、予防のお薬を使用することがあります。

◎高血圧

- ・ ご自宅で血圧を定期的に測定し、血圧の推移を確認してください。
- ・ 血圧の程度に応じて、血圧を下げるお薬を使用することがあります。
- ・ 頭痛、気分が悪いなどの症状が現れることがあります。

◎蛋白尿

- ・ むくみや腎機能障害を生じることがあります。
- ・ 血圧上昇は症状の進行に関係するため、血圧の管理も重要です。

◎血栓・塞栓

- ・ 血液中に血の塊ができたり、血の塊が血管を塞ぐことがあります。
- ・ 足にむくみがある、息苦しい、胸が痛い、意識がなくなる、麻痺が出る、言葉がうまく出ない、頭痛などの症状が現れることがあります。

◎創傷治癒遅延

- ・ 傷が治りにくくなるため、手術が予定されている場合には十分な間隔をとることが推奨されます。
- ・ 抜歯等の歯科治療など、出血を伴う処置が予定されている方は事前に医療スタッフに伝えてください。
- ・ 手術後に投与する場合は、傷の状態を考慮して投与可否が判断されます。

◎消化管穿孔

- ・ 急激な激しい腹痛、持続的な腹痛、反跳痛（腹部を押さえ急激に離れた際に痛みが増強する）などの症状が現れることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。