

三酸化ニヒ素（商品名：トリセノックス点滴静注）

【起こる可能性のある副作用】

◎悪心・嘔吐

- ・ 治療前に吐き気を予防するお薬を使用します。
- ・ 予防薬の効果が十分得られない場合は、予防のお薬を追加する場合があります。

◎QT 延長

- ・ 心電図異常のひとつで、失神や頻脈などが起こることがあります。
- ・ 定期的に心電図検査を行うことがあります。

◎肝機能障害

- ・ 肝臓に関連する血液検査の数値が異常値を示すことがあります。
- ・ 機能低下により、白目や皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、痒くなる、疲れやすくなるなどの症状が現れることがあります。

◎APL 分化症候群

- ・ 発熱、息苦しい、息切れ、胸の痛みなどの症状が現れることがあります。
- ・ 浮腫や体液貯留が起こることがあります。

◎骨髄抑制（目安の時期：1 週間後以降）

- ・ 白血球/好中球数減少（感染症にかかりやすい、発熱）、血小板減少（鼻血、あざができる、出血しやすい）、貧血（めまい、息切れ、疲れやすい）が起こることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。