

セツキシマブ サロタロカン

(商品名: アキシャルックス点滴静注)

【起こる可能性のある副作用】

◎インフュージョンリアクション

- ・ 初めて治療するときや投与速度を速めたときに起こりやすいとされています。
- ・ 点滴中もしくは点滴終了後数時間以内に発熱、悪寒(寒気)、頭痛、息苦しさなどの症状が現れることがあります。
- ・ 症状に応じて点滴を中止もしくは点滴速度を遅くしたり、予防のお薬を使用することがあります。

◎光線過敏症

- ・ 光に反応する色素が入っているため、強い光が皮膚や目に当たると、皮膚が赤くなったり、皮膚や眼に痛みを感じる可能性があります。
- ・ 投与中および投与後の一定期間は光にあたらないよう、以下のことに注意してください。

(注意事項)

投与中: 部屋の窓はカーテンやブラインド等でおおう

投与後: 外出はできるだけ避ける、屋内の照明は標準的な明るさの蛍光灯や白熱灯にする
日焼け止めの効果はないため、屋内の移動や外出時は肌が露出しないようにする

※詳細はメーカーサイト参照

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。