

シクロホスファミド（商品名：注射用エンドキサン）

【起こる可能性のある副作用】

◎悪心・嘔吐

- ・ 治療前に吐き気を予防するお薬を使用します。
- ・ 予防薬の効果が十分得られない場合は、予防のお薬を追加する場合があります。

◎出血性膀胱炎

- ・ 血尿、頻尿、排尿時痛、残尿感などの症状が現れることがあります。
- ・ 点滴当日と翌日は普段より多めの水分摂取を心掛け、我慢せずにお手洗いに行きましょう。
- ・ 予防に点滴を追加することがあります。

◎骨髄抑制(目安の時期:1週間以降)

- ・ 白血球/好中球数減少(感染症にかかりやすい、発熱)、血小板減少(鼻血、あざができる、出血しやすい)、貧血(めまい、息切れ、疲れやすい)が起こることがあります。

◎脱毛

- ・ 治療開始 2～3 週間後から脱毛が始まる場合があります。
- ・ 多くの場合、治療終了後数か月経過すると再び毛が生え始めますが、毛質が変化することがあります。
- ・ 毛髪以外(眉毛、ひげ、体毛など)も脱毛は起こります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。