

トラスツズマブ エムタンシン

(商品名:カドサイラ点滴静注用)

【起こる可能性のある副作用】

◎インフュージョンリアクション

- ・ 初めて治療するときや投与速度を速めたときに起こりやすいとされています。
- ・ 点滴中もしくは点滴終了後数時間以内に発熱、悪寒(寒気)、頭痛、息苦しさなどの症状が現れることがあります。
- ・ 症状に応じて点滴を中止もしくは点滴速度を遅くしたり、予防のお薬を使用することがあります。

◎骨髄抑制

- ・ 白血球/好中球数減少(感染症にかかりやすい、発熱)、血小板減少(鼻血、あざができる、出血しやすい)、貧血(めまい、息切れ、疲れやすい)が起こることがあります。

◎肝機能障害

- ・ 肝臓に関連する血液検査の数値が異常値を示すことがあります。
- ・ 機能低下により、白目や皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、痒くなる、疲れやすくなるなどの症状が現れることがあります。

◎末梢神経障害

- ・ 手先・足先のしびれ感、痛み、感覚異常などの症状が現れることがあります。
- ・ 繰り返しの治療により症状が起こりやすくなる場合もあります。

◎肺障害

- ・ 咳(特に痰が出ない咳)、息切れ、発熱が続くなど風邪に似た症状が現れることがあります。

◎心機能障害

- ・ 繰り返し投与することで、心臓の働きに影響を与えることがあります。
- ・ 心臓のポンプ機能が低下することにより息切れや動悸、体重増加やむくみなどの症状が現れることがあります。

ここに挙げたものは主な副作用です。ここに挙げていないものも起こる可能性があります。ささいなことでも遠慮なく主治医・看護師・薬剤師に連絡をしてください。